
Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

… et ce que le SPECT fait déjà bien



A READER'S GUIDE

Your Choices in Heart Scans

Once the stethoscope was the only tool doctors had for diagnosing heart trouble. Today, using the latest X-ray, magnetic and ultrasound scanners, they can take detailed, three-dimensional and even moving pictures of that vital organ. Here's a guide to the many choices available. —By Alice Park and Cristina Scalet

OPEN WIDE CTs are ideal for exposing narrowings in vessels that can be propped open with stents like this one

CT SCAN

How it works This test combines rapid X-ray scanning with multiple computed tomography (CT) to produce the most detailed images available of the heart's arteries without surgery. Patients receive an injection of contrast dye to highlight the blood vessels, and X rays create images of the heart in slices. A computer assembles the slices into an image of the heart that reveals calcium and fat-filled plaques lodged in the arteries.
Limitations CT scans involve radiation exposure, a particular concern for children. Those who are overweight or have stents or extensive calcium deposits won't generate useful images, since fat can distort X rays and the beams cannot penetrate metal or calcium.

CALCIUM PLUG Bulging regions along the arteries (circled) indicate sequestered calcium plaques that stand out on CT scans

BYPASS A powerful CT scanner provides a detailed look at two vein grafts (at arrows) inserted to detour blood around arterial blockages

ELECTROCARDIOGRAM (EKG)

How it works This oldest and most basic heart scan records the electrical impulses that regulate your heart's pumping action. It may seem unsophisticated, but any deviation from the normal rhythm pattern can alert doctors to the likelihood of damaged heart tissue and reduced blood flow.
Limitations While it can indicate signs of trouble, an EKG provides no visual map of the heart and cannot identify precisely what ails the organ or where in the heart the problem lies.

NUCLEAR STRESS TESTING

How it works Doctors inject a radioactive substance into the blood, then use gamma-ray cameras to see how the blood moves through the heart. The test shows how well the heart is doing at keeping itself saturated with oxygen-rich blood. The test is often done twice, to check cardiac performance at rest and under physical stress.
Limitations Carrying out two scans can take as long as five hours. The test also exposes the patient to small amounts of radiation.

FLOW CHART The heart at left is getting enough blood; dark spots on the heart at right indicate inadequate fluid

BLOCKED BLOOD: A constricted stretch of artery (arrow) that could reduce blood flow to the rest of the heart

CORONARY ANGIOGRAM

How it works This procedure is the gold standard for viewing the arteries that nourish the heart. Doctors insert a catheter through an artery in the leg and snake it up toward the heart. They then send a special dye through the tube that highlights the arteries under X rays and exposes any blockages.
Limitations Because they're invasive, angiograms have some risks: catheters can tear artery walls, requiring surgical repair. (In 1% of cases, serious complications, including death, may occur.) Afterward, patients need to lie still for four to six hours until the blood vessel in the leg seals.

PET/CT SCAN

How it works A hybrid of positron emission tomography and CT, this scan provides structural and functional information about the heart in a single scan. Doctors use the CT to physically locate narrowed regions along arteries, then apply PET to isolate parts of the heart muscle, such as the areas circled, that are deprived of blood flow as a result.
Limitations PET technology is expensive, and the hybrid machines are not widely available. The test also involves some radiation exposure.

ECHOCARDIOGRAM (ECHO)

How it works Harmless ultrasound waves, similar to the ones used to take sonograms of a fetus, are directed at the chest and bounce off the heart's walls and valves. A computer analyzes these rebounding waves and calculates the size, shape and movement of structures inside the heart. Doctors often take two echoes—one of the heart at rest and another of the heart under stress (e.g., after the patient exercises on a treadmill or after technicians have injected a drug to make the heart race). Comparison of the two images helps pinpoint abnormal valves or areas that are not receiving enough blood.
Limitations Ultrasound does not produce images with high enough resolution to see heart arteries and can highlight only the biggest changes in structures like the heart chambers.

LEAKY SEAL An echo detects a valve (arrow) that doesn't properly isolate the chambers of the heart

MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

How it works Powerful magnets create a field that sets the nuclei of atoms in heart cells vibrating. The oscillating atoms emit radio signals, which are converted by a computer into either still or moving 3-D images. The arrow at left points to a plaque-filled spot in the artery; the scan also reveals the layer of fat that envelops most hearts.
Limitations Because of the intense magnetic field, patients with pacemakers, stents or other metal implants can't get an MRI. These scans cannot pick up calcium deposits, which could signal dangerously narrowed vessels.

For additional images of the heart, both moving and still, go to time.com

Dr Ali FASSOULI
Médecin Nucléaire
Atelier ANMNL
Novembre 2018

EDITORIAL

Eur J Nucl Med Mol Imaging (2011) 38:1189–1190

Positron emission and single-photon emission imaging: synergy rather than competition


Giuliano Mariani · H. William Strauss

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

… et ce que le SPECT fait déjà bien

Les grandes pathologies en clinique / Les domaines de recherche

- Oncologie
- **Cardiologie**
- Neurologie




Quelques objectifs…..


- **La viabilité, la pathologie inflammatoire, la plaque d'athérome, les complications vasculaires….**
- Diagnostic/détection (primitif, métastases…) et optimisation de la prise en charge en cancérologie
- Maladie d'Alzheimer et démences




Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

… et ce que le SPECT fait déjà bien







Applications cliniques :

- **Oncologie: 93%**
- **Cardiologie: 4%**
- **Neurologie: 3%**

IMV 2014

PET Report (1.616.900 Clinical PET/CT and PET performed in 2014)


Sémiologie scintigraphie myocardique de perfusion

… et ce que le SPECT fait déjà bien

STRESS | **REPOS**

Cas normal

Perfusion normale



synchronisation les images à l'ECG (Gated SPECT)






FIGURE 1. ECG-gated SPECT acquisition. Separate temporal frames corresponding to different phases of cardiac cycle are acquired for each angular projection. Perfusion images are obtained from summation of individual frames. (Reprinted with permission of (5).)


Perfusion normale




Cas ischémie

ischémie







ischémie




Cas nécrose

nécrose





nécrose



… et ce que le SPECT fait déjà bien (valeur diagnostique / valeur pronostique)

Table 1. Diagnostic accu

Author, year [ref.]
Tamaki, 1984 [11]
DePasquale, 1988 [12]
Fintel, 1989 [13]
Iskandrian, 1989 [14]
Maddahi, 1989 [15]
Mahmarian, 1990 [16]
Van Train, 1990 [17]
Coyne, 1991 [18]
Quinones, 1992 [19]
Chae, 1993 [20]
Grover-McKay, 1994 [21]
Tamaki, 1994 [22]
Ho, 1997 [23]
Kiat, 1990 [24]
Pozzoli, 1991 [25]
Solot, 1993 [26]
Marwick, 1994 [27]
Van Train, 1994 [28]
Tamaki, 1994 [22]
Heo, 1994 [29]
Benoit, 1996 [30]
Shanoudy, 1998 [31]

Table 2. Diagnostic

Author, year [ref.]
Francisco, 1982 [3]
Huikuri, 1988 [33]
Go, 1990 [34]
Mendelson, 1992 [
Cramer, 1994 [36]
Grover-McKay, 19
Ho, 1995 [37]
Watanabe, 1997 [3
Tartagni, 1991 [39
Miller, 1997 [40]
Schillaci, 1997 [41
Soman, 1997 [42]
Ogilby, 1998 [43]
Santoro, 1998 [44]
He, 1997 [45]

Table 3. Diagnostic a

Author, year [ref.]
Nguyen, 1990 [46]
Verani, 1990 [47]
Coyne, 1991 [18]
Nishimura, 1991 [48]
Allman, 1992 [49]
Pennell, 1995 [50]
Mohiuddin, 1996 [51]
Amanullah, 1993 [52]
Marwick, 1993 [53]
Jamil, 1999 [54]
Kapur, 2002 [55]a



Clinical value, cost-effectiveness, and safety of myocardial perfusion scintigraphy: a position statement

Claudio Marcassa[1]*, Jeroen J. Bax[2], Frank Bengel[3], Birger Hesse[4], Claus L. Petersen[5], Eliana Reyes[6], and Richard Underwood[6] on behalf of the European Council of Nuclear Cardiology (ECNC), the European Society of Cardiology Working Group 5 (Nuclear Cardiology and Cardiac CT), and the European Association of Nuclear Medicine Cardiovascular Committee

[1]Cardiology Department, S. Maugeri Foundation, IRCCS Scientific Institute of Veruno, V. Revislate 13, 28010 Veruno, NO, Italy; [2]Department of Cardiology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands; [3]Division of Nuclear Medicine, John Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA; [4]Department of Nuclear Medicine and PET, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; [5]Department of Nuclear Medicine, Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; [6]National Heart and Lung Institute, Imperial College London, London, UK

European Heart Journal (2008) 29, 557–563
doi:10.1093/eurheartj/ehm607

Table 1 Recommendations for myocardial perfusion scintigraphy in patients with suspected or known coronary artery disease according to current clinical guidelines

Clinical scenario	Recommendation	Issuing body	Class	Level of evidence	Reference
Chronic chest pain	Diagnosis of CAD in patients with intermediate pre-test likelihood of CAD:				
	Unable to exercise	ESC			
	Abnormal resting ECG	ACC/AHA			
Chronic chest pain	Diagnosis of CAD in patients with intermediate pre-test likelihood of CAD: - Unable to exercise - Abnormal resting ECG	ESC ACC/AHA			
	Identification of target coronary lesions	ESC ACC/AHA			
	Assessment of haemodynamic significance of coronary stenosis	ESC ACC/AHA			
	Evaluation post-PCI or CABG	ESC ACC/AHA			
Acute chest pain	Detection of resting ischaemia	ESC ACC/AHA			
	Detection of ischaemia in low to intermediate risk patients after UA/NSTEMI	ESC ACC/AHA			
	Detection of ischaemia in patients with uncertain diagnosis	ESC ACC/AHA			
	Assessment of infarct size and myocardium at risk after STEMI	ESC ACC/AHA			
Pre-operative risk assessment	Risk stratification before elective non-cardiac surgery	ACC/AHA			
Heart failure	Detection of ischaemia and viability assessment	ACC/AHA ESC study group report			
	Diagnosis of CAD	ACC/AHA			

ACC, American College of Cardiology; AHA, American Heart Association; CABG, coronary artery bypass grafting; CAD of Cardiology; NSTEMI, non-ST-segment elevation myocardial infarction; PCI, percutaneous coronary intervention; STE UA, unstable angina.

Conclusions


MPS has proven a safe and highly cost-effective strategy for the early detection of obstructive CAD in symptomatic individuals. It is powerful to stratify patients according to their risk of cardiac death or nonfatal myocardial infarction and assists clinical decision-making with regard to medical treatment and intervention. A large body of evidence supports the current application of MPS, and radionuclide imaging guidelines have been established by multiple societies. Also, MPS is successfully integrated in several guidelines for clinical practice in cardiology. Further, formal integration of this diagnostic and prognostic tool into the clinical practice and training of general cardiology is encouraged.

Iskander & al. JACC 1998;32:57-62

Underwood & al. Eur JNM & Mol Im. 2004;31 :261 –291


Cas Cliniques….







Sémiologie Scinti Myocardique









NORMAL




ISCHEMIE



INFARCTUS






Scintigraphie myocardique

- Modèle à 17 segments

Circulation 2002; 105; 539-542

17 segment model

1. basal anterior
2. basal anteroseptal
3. basal inferoseptal
4. basal inferior
5. basal inferolateral
6. basal anterolateral
7. mid anterior
8. mid anteroseptal
9. mid inferoseptal
10. mid inferior
11. mid inferolateral
12. mid anterolateral
13. apical anterior
14. apical septal
15. apical inferior
16. apical lateral
17. apex



Catégories	Score
Fixation normale	0
Légèrement réduite – sub-normale ou suspecte (habituellement 70 à 80% du max.)	1
Modérément réduite – définitivement anormale (habituellement 50 à 70% du max.)	2
Sévèrement réduite (habituellement < 50% du max.)	3

Quantification
Localisation



SPECT : cas Clinique n°1 (ou recherche de coronaropathie chez un patient à risque)

- Mr C, patient de 74 ans (août 2006)
- Antécédents :
  - Pace maker implanté en 1997 pour maladie rythmique auriculaire
  - AVC régressif en 1997
  - Remplacement du PM en sept 2005
- FDR cardio-vasculaire :
  - Tabagisme sevré, Dyslipidémie, Hyperglycémie, Obésité (85 kg, Taille 1,6 m)
- ECG : RS
- Holter : salves de tachycardie ventriculaire
- **Recherche ischémie**



SPECT : cas Clinique n°1 (ou recherche de coronaropathie chez un patient à risque)

- Scintigraphie myocardique:
  - Perfusion de dipyridamole
    - **0,56 mg/Kg sur 4 min**
  - Test non maquillé
  - Cliniquement négatif
  - Électriquement négatif






  - Synchronisée
  - Décubitus ventral
  - ^{99m}Tc Tétrofosmine - Protocole stress/repos 1 jour
    - 3,7 MBq/kg puis 11 MBq/kg
    - 32 proj 40 sec/proj puis 30 sec/proj





SPECT : cas Clinique n°1 (ou recherche de coronaropathie chez un patient à risque)






SPECT : cas Clinique n°1 (ou recherche de coronaropathie chez un patient à risque)

- Votre évaluation…?


  - ☐ 1. Ischémie myocardique antérieure et inférieure
  - ☐ 2. Ischémie myocardique inférieure et inféro-latérale
  - ☐ 3. Artéfact d'atténuation inférieure
  - ☐ 4. Artéfact d'atténuation mammaire









SPECT : cas Clinique n°1 (ou recherche de coronaropathie chez un patient à risque)









- Quantification de la perfusion

SPECT : cas Clinique n°1 (ou recherche de coronaropathie chez un patient à risque)

- Votre évaluation…?

  - ☐ 1. Ischémie myocardique antérieure et inférieure
  - ☐ **2. Ischémie myocardique inférieure et inférolatérale**
  - ☐ 3. Artéfact d'atténuation inférieure
  - ☐ 4. Artéfact d'atténuation mammaire





⇒ **Coronarographie**

SPECT : cas Clinique n°1 (ou recherche de coronaropathie chez un patient à risque)

Coronarographie

- Fonction VG altérée calculée à 58 %
- « Hypokinésie inféro-basale assez limitée et possiblement latérale »

- IVA infiltrée
- Sténose subocclusive de la 1ère marginale moyenne
- CD dominante ectasique



⇒ **Stent (nu) de la lésion marginale**

SPECT : cas Clinique n°2 (ou évaluation après revascularisation)

- Mr L, patient de 47 ans (Oct 2005)

- FDR : diabète type II
- Antécédents: IDM ant (Fev 2001): stent IVA
- Contrôle coro en Aout 2002:
  - IVA II 50%
  - Ostium Mg < 50%
  - CD II < 50%


Dyspnée d'effort
EE (Bruce) sous traitement, 5 min, 40% FMT blockpnée sans modif ECG



SPECT : cas Clinique n°2 (ou évaluation après revascularisation)

S

R



S

R






	Effort	Repos
VTD	103	107
VTS	39	40
FE VG	62%	62%

Mr L.
Oct 2005

SPECT : cas Clinique n°2 (ou évaluation après revascularisation)

- Votre attitude…?
  - 1. Coro ?
  - 2. Atténuation…, on ne fait rien ?
  - 3. Optimisation du TRT médical ?
  - 4. Contrôle scinti ultérieur ?





Optimisation TRT médical + Contrôle

SPECT : cas Clinique n°2 (ou évaluation après revascularisation)

- Mr L, patient de 47 ans, diabète type II

- Evaluation sous traitement médical (Avril 2006)

- *IDM Ant (Fev 2001): stent IVA*
- *Contrôle coro en août 2002:*
  - *IVA II 50%*
  - *Ostium Mg < 50%*
  - *CD II < 50%*

Dyspnée d'effort
EE sous traitement, 36% FMT, dyspnée



SPECT : cas Clinique n°2 (ou évaluation après revascularisation)

S


R

S

R

S

R



	Effort	Repos
VTD	83	115
VTS	30	42
FE VG	63%	64%

Mr L.
Avril 2006

SPECT : cas Clinique n°2 (ou évaluation après revascularisation)


- Votre attitude…?
  - 1. Coro ?
  - 2. Toujours pas de coro?




Coro

Sténose IVA proximale (re)stentée

Mr L



Oct 2005



Avr 2006

SPECT : cas Clinique n°2 (ou évaluation après revascularisation)

S


R

S

R

S

R



- Examen de suivi
- Test mixte négatif
- Asymptomatique

- FEVG (effort): 67%
- VTD: 116 ml
- VTS: 38 ml

Mr L.
Oct 2006

SPECT : cas Clinique n°3 (ou évaluation après TRT chez patiente BBG complet)

- Mme L, patiente de 79 ans, octobre 2012
- Antécédents :
  - SCA ST- en 2011 => sténose intermédiaire du TC traitée médicalement
- FDR cardio-vasculaire :
  - HTA, obésité (100 kg pour 1,74 m)
- **Dépistage**, Asymptomatique
- ECG BBG complet ancien



SPECT : cas Clinique n°3 (ou évaluation après TRT chez patiente BBG complet)

- Scintigraphie myocardique:
  - Stress pharmacologique (dipyridamole)
    - **0,56 mg/Kg sur 4 min**
  - Test non maquillé
  - Cliniquement négatif
  - Électriquement négatif






  - Synchronisée
  - Décubitus ventral
  - ^{99m}Tc Sestamibi - Protocole stress/repos 1 jour
    - 3,7 MBq/kg puis 11 MBq/kg
    - 32 proj 40 sec/proj puis 30 sec/proj






SPECT : cas Clinique n°3 (ou évaluation après TRT chez patiente BBG complet)



02/10/2012



06/10/2011


SPECT : cas Clinique n°3 (ou évaluation après TRT chez patiente BBG complet)

- Votre évaluation…?


  - ☐ 1. Ischémie myocardique inférieure
  - ☐ 2. Ischémie myocardique latérale
  - ☐ 3. Artéfact d'atténuation inférieure
  - ☐ 4. Artéfact d'atténuation mammaire








SPECT : cas Clinique n°3 (ou évaluation après TRT chez patiente BBG complet)





- Quantification de la perfusion


SPECT : cas Clinique n°3 (ou évaluation après TRT chez patiente BBG complet)

- Votre évaluation…?

  - ☐ **1. Ischémie myocardique inférieure**
  - ☐ 2. Ischémie myocardique latérale
  - ☐ 3. Artéfact d'atténuation inférieure
  - ☐ 4. Artéfact d'atténuation mammaire







SPECT : cas Clinique n°3 (ou recherche de coronaropathie chez un patient à risque)

Coronarographie


- Sténoses 30 % du TC et 1ere marginale
- IVA et Circonflexe irrégulières
- Sténose serrée CD …




⇒ **Stent actif CD**

Malgré les challenges du SPECT….

- Durée d'acquisition
- Artéfacts et attenuation
- Résolution des images
- Irradiation / Dosimétrie
- Quantification du flux coronaire?






One-Day Tc-99m-Agent Protocol

Radiation Exposure of Various Cardiac Imaging Procedures


Procedure	*Total body effective dose*[a]
Tl-201 stress redistribution (4 mCi)	25.1 mSv (2.5 Rem)
Dual isotope (3 mCi Tl-201 + 30 mCi Tc-99m)	26.3 mSv (2.6 Rem)
Tc-99m tetro rest–stress (10+30 mCi)	11.2 mSv (1.1 Rem)
Tc-99m sestamibi rest–stress (10+30 mCi)	12 mSv (1.2 Rem)
Tc-99m sestamibi 2-day stress rest (30+30 mCi)	17 mSv (1.7 Rem)
Rb-82 rest–stress (45+45 mCi)	11.3 mSv (1.1 Rem)



Caméra conventionnelle vs CZT….



Anger (20 / 16 min)



CZT (5 / 3 min)

H, 69 ans
FDR
Angor

Examen normal

- Imagerie Accélérée
- Dosimétrie Réduite
- Performance identique

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Malgré les challenges du PET…. (vs SPECT)

- Traceurs à demi-vie courte
- Stress pharmaco / physique? (TEP perfusion)
- Coût des traceurs (82Rb, traceurs fluorés)
- Coût des caméras
- Disponibilité du TEP-Scan (activité onco ≈ 93 à 95%)

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Malgré les challenges du PET…. (vs SPECT) – Les traceurs

- Détection / Evaluation de coronaropathie
(nos patients sont de plus en plus obèses…)

- Etude de la viabilité myocardique

- Etude des myocardiopathies inflammatoires
(Sarcoïdose…)

- Etudes de pathologies infectieuses cardiovasculaires
(Endocardite…)

Table 1 Characteristics of various cardiac PET perfusion tracers

	^{18}F-Flurpiridaz	^{15}O-water	^{13}N-ammonia	^{82}Rb chloride
Half life	110 min	2.1 min	10 min	76 sec
Positron range	1.03 mm	4.14 mm	2.53 mm	8.6 mm
Production	Regional cyclotron	On-site cyclotron	On-site or nearby cyclotron	Generator
Image resolution	Highest	Intermediate	Intermediate-high	Lowest
Myocardial extraction fraction	>90%	100%	80%	65%
Treadmill exercise Imaging	Feasible	Not feasible	Feasible but not practical	Not feasible


Tracer	Half life	Type	Requirements
^{18}FDG	110 min	Metabolic	Cyclotron

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Détection / Evaluation de coronaropathie (nos patients sont de plus en plus obèses…)

Meilleure résolution spatiale avec le TEP-Scan

Homme 57 ans
120 Kg
174 cm




Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Détection / Evaluation de coronaropathie

SPECT (n=112) vs. PET MPI (n=112)

PET supérieur ?
Qualité, confiance, précision



Bateman et al JNC 2006


Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Détection / Evaluation de coronaropathie

Mais…


Linéarité


Fixation Myocardique
et
Débit Coronaire





Does Rubidium-82 PET Have Superior Accuracy to SPECT Perfusion Imaging for the Diagnosis of Obstructive Coronary Disease? : A Systematic Review and Meta-Analysis






Mc Ardle B et al, JACC 2012, 60:18; 1828-1837

Does Rubidium-82 PET Have Superior Accuracy to SPECT Perfusion Imaging for the Diagnosis of Obstructive Coronary Disease? : A Systematic Review and Meta-Analysis

Comparaison TEP / SPECT

TEP

SPECT



Mc Ardle B et al, JACC 2012, 60:18; 1828-1837

Does Rubidium-82 PET Have Superior Accuracy to SPECT Perfusion Imaging for the Diagnosis of Obstructive Coronary Disease? : A Systematic Review and Meta-Analysis


Comparaison TEP / SPECT

TEP

Se = 90%
Sp = 88%

SPECT

Se = 85%
Sp = 85%




Mc Ardle B et al, JACC 2012, 60:18; 1828-1837

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Détection / Evaluation de coronaropathie

Développement traceur fluoré pour TEP perfusion - 18F-Flurpiridaz

- **Extraction Myocardique > 90%**
- Fixation Mitochondrie
- Fixation Myocardique Prolongée
- **Linéarité avec Débit Coronaire Excellent**







Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Détection / Evaluation de coronaropathie

Développement traceur fluoré pour TEP perfusion - 18F-Flurpiridaz

- **Extraction Myocardique > 90%**
- Fixation Mitochondrie
- **Fixation Myocardique Prolongée**
- Linéarité avec Débit Coronaire Excellent





Phase 1 - Maddahi et al. J Nucl Med 2011; 52: 1490

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Détection / Evaluation de coronaropathie


- **Meilleure qualité d'images**
- **Meilleure efficacité diagnostique**


Acquisition TEP/CT
- CT avant images TEP (AC)
- Image Mode List – Protocole Rest/Stress
- Acq repos post IV Flurpiridaz (2 à 3 mCi) , Durée ≈ 20min
- **Stress physique** (6.48 ± 1.23 mCi), ≈ 73 min post repos (n=76)

Ou **Stress pharmacol** (6.76 ± 1.78 mCi), ≈ 53 min post repos (n=67)

Homme, 75 ans
IMC = 32,6

TEP normal
SPECT anormal (defect reversible infero-basal?)
Coronaro normale





Phase 2 - Berman et al. J Am Coll Cardiol 2013


Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Détection / Evaluation de coronaropathie

- Meilleure qualité d'images
- Meilleure efficacité diagnostique

Homme, 82 ans
Dyspnée

Occlusion IVA proximale
Occlusion sur pontage (mammaire interne, territoire IVA)




Phase 2 - Berman et al. J Am Coll Cardiol 2013

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Détection / Evaluation de coronaropathie - Quantification du flux ?


Développement traceur fluoré pour TEP perfusion
18F-Flurpiridaz (actuellement en phase 3)



F-18 Flurpiridaz PET post-épreuve d'effort

Premier Passage: Débit Coronarien Quantitatif


Débit Coronarien Segmentaire



Phase 2 - Nekolla Curr Cardiol Rep 2011;13; 145

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude de la viabilité myocardique (FDG – TEP)




Le métabolisme énergétique cardiaque présente un certain nombre de spécificités :

- La **consommation énergétique** du coeur est très élevée

- Il y a **peu de réserves**, mais **les substrats sont très variés**

- Dans le coeur normal, la quasi-totalité (>95%) de l'ATP provient de la **phosphorylation oxydative** (d'où l'importance de l'apport en O2)






L'utilisation de ces substrats nécessite un apport d'O2, et permet la production du travail cardiaque avec un rejet de CO2 et d'H2O

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude de la viabilité myocardique (FDG – TEP)



Intérêt d'une bonne préparation du patient :

- But : Forcer le myocarde à passer sur un métabolisme glucidique (= provoquer un pic d'insuline)

Jeun de 6 à 12h (« mode acides gras ») → Charge de **glucose** (PO ou IV) *ou* **hyperinsulinémie** euglucidique → 40 min à 2 h → Injection de ^{18}F-FDG lors du pic d'insuline (« mode glucose »)



Acquisition 30 min post IV, Durée acquisition ≈ 30 ± 10 min (patient DD, immobile…)

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude de la viabilité myocardique et FDG-TEP


Ischémie et région infarcie peut être distinguée en analysant une imagerie de perfusion (TEP ou SPECT) et une imagerie du métabolisme (^{18}FDG-TEP)

- “Aspect Mismatch”
(hypoperfusion mais métabolisme conservé) = region ischémique mais viable

- “Aspect Match”
(absence de perfusion et métabolisme) = pas de viabilité



En cas de diminution sévère de la perfusion myocardique => augmentation de l’utilisation du glucose



Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude de la viabilité myocardique et FDG-TEP

Dans les 2 cas : ralentissement du flux sanguin du a une **sténose de la coronaire droite** => hypoperfusion de la paroi inferieure


- "Aspect Mismatch" :
augmentation du signal en FDG dans le territoire hypoperfusé => cellules viables

- "Aspect Match" :
diminution de la perfusion avec diminution concordante de la captation de FDG (donc du metabolisme) => **nécrose**

*NB: Lorsqu'elles sont **saines**, les **cellules myocardiques** utilisent préferentiellement les **acides gras libres**.*
*La **diminution du débit sanguin coronaire** entraine une **modification du métabolisme** : les cellules basculent d'une utilisation des AGL vers une utilisation du **glucose***



En cas de diminution sévère de la perfusion myocardique => augmentation de l'utilisation du glucose



Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….


Etude des myocardiopathies inflammatoires – La sarcoïdose (FDG – TEP)

- Lymphogranulomatose inflammatoire systémique de cause inconnue
  - Diagnostic difficile

- Atteinte cardiaque;
  - Incidence variable selon les études (5-10% sur critères cliniques, 25-30% sur critère histologique d'autopsie)

  - Infiltration granulomateuse du VG et du septum => Troubles de conduction (BAV…), de l'excitabilité (TV…)

18FDG – TEP whole boby



Chronic active sarcoïdosis



L'atteinte cardiaque est responsable de la moitié des décès


Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude des myocardiopathies inflammatoires - Sarcoïdose cardiaque et FDG-TEP

- **Intérêt d'une bonne préparation du patient :**

  - Le traceur est le même que pour la viabilité (=FDG)


  - But : Forcer le myocarde à passer sur un métabolisme en acide gras (= hypofixation du tissu sain)



Marqueur = Fluor 18 (^{18}F) :

- $T_{1/2}$ = 110 minutes

Régime hypoglucidides / Riche en graisse (« métabolisme acides gras ») → Injection de ^{18}F-FDG pas de sécrétion d'insuline (« métabolisme acides gras »)






*peut être remplacées par du saumon fumé, une omelette avec 4 oeufs, et une salade verte avec huile d'olive (2 cuillères à soupe), mais surtout pas de pain

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude des myocardiopathies inflammatoires – La sarcoïdose (FDG – TEP)



Absence de fixation ou fixation diffuse
= NORMAL

Foyers de fixation localisé net ou hétérogénéité
= ANORMAL


Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude des myocardiopathies inflammatoires - Sarcoïdose cardiaque et FDG-TEP

Présence de macrophages médiateurs de l'inflammation au sein des sites de sarcoïdose active

- Hypermétabolisme glucidique au sein de ces macrophages

→ **hyperfixation du 18FDG au sein des sites actifs**
(Bonne corrélation avec l'IRM)





nécessité d'un protocole diminuant la fixation myocytaire du traceur (régime riche en AG, pauvre en glucide…)

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude des myocardiopathies inflammatoires - Sarcoïdose cardiaque et FDG-TEP

Recommandations Japonaises ; MHLW Guidelines (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan)

Table 1 Japanese Guidelines and Recommendations

Name	Date issued	Direction
JMHW clinical guidelines	1993	Diagnosis of cardiac involvement of sarcoidosis Major diagnostic criteria include ^{67}Ga uptake
JCS guidelines for cardiac nuclear medicine (6)	2012	^{67}Ga scintigraphy: Diagnosis and clinical evaluation (Class 2a)
JSNC recommendation for ^{18}F-FDG PET for cardiac sarcoidosis (10)	2014	Standard approaches for fasting ^{18}F-FDG PET imaging for diagnosis of CS

Table 2 Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare's approval of use of SPECT and PET in nuclear cardiology

Test	Date of approval	Indication
^{15}O-labeled gas	1996	Diagnosis of heart disease
^{18}F-fluorodeoxyglucose	March 8, 2002	Diagnosis of viability (in case of difficult to diagnosis myocardial viability using myocardial SPECT)
	March 5, 2012 (Additional approval)	Detection of inflammatory myocardial regions in cardiac-involvement sarcoidosis



Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude des myocardiopathies inflammatoires - Sarcoïdose cardiaque et FDG-TEP

Joint SNMMI–ASNC Expert Consensus Document on the Role of ^{18}F-FDG PET/CT in Cardiac Sarcoid Detection and Therapy Monitoring

Expert Content Reviewers:
Timothy M. Bateman, Manuel D. Cerqueira, Vasken Dilsizian, Gary V. Heller, David R. Moller, Michael T. Osborne, Mehran M. Sadeghi, and Prem Soman

- Le diagnostic de SC reste un challenge
- TEP-FDG dans l'algorithme diagnostic (*Heart Rythm Society*)
- Coupler perfusion + métabolisme
- Importance régime +++
- Contexte clinique du patient
- Données additionnelles nécessaires



	Spectrum of disease by PET/CT to evaluate rest perfusion and metabolism					
	Normal perfusion and metabolism		Abnormal metabolism		Abnormal perfusion and/or metabolism	
Perfusion						
	Normal	Normal	Normal	Abnormal	Abnormal	Abnormal
FDG						
	Normal (Negative)	Diffuse (non-specific)	Focal increase	Focal increase	Focal increase (different areas)	Normal (Negative)
Interpretation	Normal	Non-specific*	Early Disease	Mismatch Pattern	Scar and Inflammation	Scar

*Likely failure to suppress FDG uptake by normal myocardium although rarely can also be seen with diffuse disease


J Nucl Med 2017


Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….


Etude des myocardiopathies inflammatoires - Sarcoïdose cardiaque et FDG-TEP

The Use of ^{18}F-FDG PET in the Diagnosis of Cardiac Sarcoidosis: A Systematic Review and Metaanalysis Including the Ontario Experience

7 études
164 patients
MHLW Guidelines (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan)
Performance TEP-FDG :
- **Se = 89 %**
- **Sp = 78 %**







2 mois plus tard

Femme, 57 ans, TV, IC congestive (NYHA, stade III)
Sarcoïdose pulmonaire, bonne réponse sous traitement corticoïde (prednisone, 30 mg/j)




Youcef et al., J Nucl Med 2012

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etude des myocardiopathies inflammatoires - Sarcoïdose cardiaque et FDG-TEP

Bilan et suivi sous corticothérapie chez un homme de 66 ans



Avant traitement :
IRM + et TEP +

Controle à 4 mois de corticothérapie


TEP(-) et ↘ IRM
Baisse des symptômes


Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etudes de pathologies infectieuses cardiovasculaires

Endocardite infectieuse et rôle du ^{18}FDG

- Recherche d'endocardite





Sources : Zhang-Yin 2016

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….


Etudes de pathologies infectieuses cardiovasculaires

Endocardite infectieuse et rôle du ^{18}FDG

- Pathologie infectieuse des valves dont la morbi-mortalité reste élevée

- Présentation clinique polymorphe : fièvre, asthénie, signes cutanés…

- Confirmation diagnostique (critères de DUKE) :
  - Hémocultures répétées
  - Echographie cardiaque



Hypermétabolisme valve vitrale



Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Etudes de pathologies infectieuses cardiovasculaires

Endocardite infectieuse et rôle du ^{18}FDG

EANM/SNMMI Guideline for ^{18}F-FDG Use in Inflammation and Infection*

Francois Jamar[1] (Chair), John Buscombe[2], Arturo Chiti[3], Paul E. Christian[4], Dominique Delbeke[5], Kevin J. Donohoe[6], Ora Israel[7], Josep Martin-Comin[8], and Alberto Signore[9]

Although there is still insufficient literature for this to be described as an evidence-based indication, we can conclude, on the basis of a cumulated reported accuracy (>85%) and expert opinion that major indications for ^{18}F-FDG PET/CT in infection and inflammation are as follows:

- Sarcoidosis (*9–15*).
- Peripheral bone osteomyelitis (nonpostoperative, non–diabetic foot) (*16–23*).
- Suspected spinal infection (spondylodiskitis or vertebral osteomyelitis, nonpostoperative) (*24–28*).

Considering the available published data, it is unclear if ^{18}F-FDG imaging offers any significant advantage over radiolabeled white blood cells or antigranulocyte monoclonal antibodies in the following situations:


- Diabetic foot infections (*88–92*).
- Joint prosthetic infections (*93–109*).
- Vascular prosthetic infections (*110–114*).
- Inflammatory bowel diseases (*115,116*).
- Endocarditis (*117–119*).



J Nucl Med 2013

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Relation anatomie / sténose / pronostic



Naghavi & al. Circulation. 2003;108:1664-1672

Imagerie de la plaque athéromateuse à risque


Imaging Atherosclerotic Plaque Inflammation With [^{18}F]-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

2 AIT

(épisode d'hémiparésie)

AS

(sténose carotidienne asymptomatique)



TEP FDG **Angio CT** **fusion**

Rudd & al., Circulation 2002;105;2708-11

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Safety and efficacy of dalcetrapib on atherosclerotic disease using novel non-invasive multimodality imaging (dal-PLAQUE): a randomised clinical trial

Zahi A Fayad, Venkatesh Mani, Mark Woodward, David Kallend, Markus Abt, Tracy Burgess, Valentin Fuster, Christie M Ballantyne, Evan A Stein, Jean-Claude Tardif, James H F Rudd, Michael E Farkouh, Ahmed Tawakol, for the dal-PLAQUE Investigators

- 130 patients randomisés: dalcetrapib 600 mg/j ou placebo pendant 24 mois
- 1ère étude multicentrique évaluant des indices inflammatoires et structurels de l'athérosclérose comme critères d'évaluation:
  - Inflammation artérielle avec ^{18}F-FDG PET/CT (après 6 mois)
  - Anatomie des vaisseaux avec IRM (à 24 mois)



PET-MRI

The Lancet 2011;378:1547-59

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

Evaluation de la plaque vulnérable chez des patients coronariens à risque ??


Les traceurs TEP / L'imagerie :


18F-NaF (marqueur Ca++ vasculaire associé à la plaque à risque)
- Sensibilité +++, identification microCa++ et plaque v
- Mais, résolution spatiale ↓, mvts cardiaque => quant




18F-FDG
- Visualisation macroCa++
- Mais limite pour évaluation coronaires (fixation myocardique)

Imagerie structurelle (CT, IRM):
- Résolution +++, estimation sténoses, m
- Mais identification et quantification de C
- Artéfacts de mvts (contraction, respirat









Wang et al., J Am Heart Assoc. 2018
Forsythe et al., J Am Coll Cardiol 2018
Adamson et al., Cardiovasc Diagn Ther 2015
Joshi et al., Lancet 2014

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

… et ce que le SPECT fait déjà bien

- SPECT: méthode robuste, validée et simple
  - Effort, pharmaco, ou mixte
  - Quantification de l'ischémie
  - Impact démontré sur la stratégie de revascularisation

- TEP-CT:
  - Correction de l'atténuation (obèses, femmes)
  - Quantification absolue du flux coronaire
  - Va être possible à l'effort (traceurs fluorés)
  - Perfusion et Métabolisme



- Imagerie de la plaque vulnérable ??

Ce que le PET-Scan peut apporter à la cardiologie nucléaire….

… et ce que le SPECT fait déjà bien

Quelque soit la technique, notre Responsabilité est de….

- Réaliser un examen « pertinent » (argumenté)
- Contribuer à un diagnostic correct

- Identifier Patients à Faible et Haut Risque

Contribuer au traitement / prise en charge des Patients



Merci !!



" La simplicité est la sophistication suprême " (Léonard de Vinci)